



ISTEROSALPINGOGRAFIA

L'isterosalpingografia è un esame radiologico contrastografico, eseguito mediante l'introduzione di mezzo di contrasto nella cavità uterina. Può essere semplice indagine diagnostica oppure interventzionale potendosi proporre in alcuni casi per il ripristino della pervietà tubarica. Fornisce informazioni essenzialmente di tipo morfologico sulla conformazione del collo uterino, dell'utero e delle tube e di tipo funzionale essendo in grado di testare la pervietà di queste ultime. Trattandosi di strutture cave il mezzo di contrasto si dispone al loro interno fornendo una immagine "a stampo" documentata da radiografie eseguite durante le diverse fasi dell'esame.

Informativa

Per eseguire l'esame è necessario denudarsi parzialmente ed indossare un camice monouso. Eseguire delle proiezioni seguendo le indicazioni riguardo il posizionamento fornite dall'operatore. E' richiesta collaborazione e tolleranza da parte della paziente per la riuscita di un buon esame. L'esame verrà eseguito con delicatezza e nel rispetto della singola persona.

Esami Preliminari

Tampone Vaginale con esito negativo poiché, nel caso di infezioni, non è possibile eseguire l'esame.

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Portare esami eseguiti in precedenza (Ecografie, Mammografia, RM) ed eventuali cartelle cliniche o documentazioni attinenti l'esame;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico.

Il giorno precedente l'esame ed il giorno dell'esame effettuare una lavanda vaginale.

Il giorno dell'esame è indispensabile fare un piccolo clistere di pulizia. È anche utile portare con sé degli assorbenti da utilizzare dopo l'esame.

Al fine di prevenire la possibilità di contaminazioni batteriche è importante osservare una breve profilassi antibiotica assumendo un antibiotico ad ampio spettro, il giorno dell'esame ed il giorno successivo all'indagine isterosalpingografica, come verrà spiegato dal medico il giorno dell'esame..

E' importante eseguire l'esame dal 7° al 12° giorno dalla comparsa del ciclo mestruale e astenersi da rapporti sessuali, salvo diversa indicazione medica.

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione .

Il giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5-6 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l' esame:

- assumere al mattino una compressa di BENTELAN 1 mg.
- assumere a mezzogiorno una compressa di ZANTAC 300mg (in alternativa Ranitidina 300mg).
- assumere alla sera una compressa di TRIMETON 4 mg (in alternativa Zirtec 10mg)

Mavis S.r.l.

C.F. e P. Iva 07153721217 – Rea 865157 – Capitale Sociale Euro 50.000,00

Via Dante 13/15 – 80058 Torre Annunziata (NA)

Tel 081.861 12 76 Fax 081. 861 69 34

www.mavissrl.it – info@mavissrl.it