



T.A.C. ADDOME E PELVI CON M.D.C.

L'esame contrastografico è costituito dal binomio di un semplice esame T.A.C. con l'utilizzo del mezzo di contrasto, una sostanza iodata, non ionica, idrosolubile che viene iniettata per via endovenosa tramite un ago cannula.

Esso altera il contrasto di un organo, di una lesione, in modo da rendere visibili dettagli che altrimenti risulterebbero non apprezzabili.

Il loro utilizzo è generalmente necessario nello studio dei parenchimi e nelle indagini vascolari.

Informativa

La parte anatomica di interesse dovrà essere priva di oggetti metallici, al paziente verrà inserito un ago cannula per la somministrazione del mezzo di c e chiesto di distendersi in posizione supina sul lettino Tac per l'esecuzione dell'esame che avrà una durata variabile dai 20 ai 30 minuti.

Esami Preliminari

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- **Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT;**
- **Ricerca Kappa e Lambda nelle urine 24 h o siero.**
- **Rx torace**
- **Ecg**

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare;
- Portare l'impegnativa preparata dal Vostro Medico come segue:

1. Cod. 88016.001 :Tac addome completo senza e con m.d.c.

Preparazione

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione .

Il giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 7-8 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l' esame:

- assumere al mattino una compressa di ***PREDNISONA 50 mg.***
- assumere a mezzogiorno una compressa di ***OMEPRAZOLO 20 mg*** (a meno che non si assuma già altro gastroprotettore).
- assumere alla sera una compressa di ***CETRIZINA 10 mg.***

Nei pazienti diabetici che assumono la metformina, previa consultazione del diabetologo, sostituire la stessa con altro ipoglicemizzante orale, due giorni prima due giorni dopo l'esame.

N.B.: Per i soggetti Cardiopatici, con obesità patologica o pazienti neoplastici defedati è necessario esibire in visione anche un **Ecocolordoppler Cardiaco** eseguito non oltre i 4 mesi precedenti.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76, 081 536.79.25** o consultate il nostro sito:
www.mavissrl.it

Mavis S.r.l.

C.F. e P. Iva 07153721217 – Rea 865157 – Capitale Sociale Euro 50.000,00

Via Dante 13/15 – 80058 Torre Annunziata (NA)

Tel 081.861 12 76 Fax 081. 861 69 34

www.mavissrl.it – info@mavissrl.it