



TAMPONE VAGINALE Di competenza del Medico Specialista

Preparazione

Materiale per la raccolta	Modalità di raccolta
<ul style="list-style-type: none">• Tamponi con terreno di trasporto Stuart o Amies,• Tamponi a secco.	<p>Affinchè il prelievo vaginale risulti idoneo è necessario che la paziente si attenga ai seguenti suggerimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;• non essere in periodo mestruale;• non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame;• aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico locale o generale da almeno 3 giorni. <p>Il prelievo deve essere effettuato dal fornice posteriore vaginale mediante tamponi sterili previa introduzione di uno speculum bivalve sterile.</p>
<p><u>In gravidanza</u>(Tampone vagino-rettale): per la prevenzione dell'infezione neonatale da Streptococcus Agalactiae(SGB) il tampone vaginale va eseguito verso la 35a-36a settimana di gestazione. Per questa finalità è necessario effettuare contemporaneamente la ricerca anche a livello rettale.</p> <p><u>Età pediatrica</u>: L'esame può essere eseguito su secrezioni vaginali, in casi di sintomatologia a carico dei genitali esterni può essere indicata l'esecuzione di un tampone vulvare.</p>	

Modalità di conservazione e trasporto

- Ricerca di Germi comuni e miceti: riporre il tampone nel terreno di trasporto e consegnare al Laboratorio o conservare a temperatura ambiente fino ad un massimo di 24 ore.
- Ricerca di Trichomonas Vaginalis: il tampone deve essere consegnato prontamente in Laboratorio.

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76, 081 536.79.25** o consultate il nostro sito:
www.mavissrl.it

Mavis S.r.l.