



ANGIO-TC DEGLI ARTI INFERIORI

L'angio-Tc è un esame che con semplici scansioni assiali TAC e la somministrazione di mezzo di contrasto per via endovenosa permette la visualizzazione dei grossi vasi, arteriosi e venosi. Mediante operazioni post-processing consente la formazione di immagini sul piano coronale, sagittale e ricostruzioni MIP e 3D.

Informativa

La parte anatomica di interesse dovrà essere priva di oggetti metallici, al paziente verrà inserito un ago cannula per la somministrazione del mezzo di contrasto e chiesto di distendersi in posizione supina sul lettino Tac per l'esecuzione dell'esame che durerà circa 30 minuti.

Esami Preliminari

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- **Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT;**
- **ricerca proteina di Bence Jones urine 24 h o su siero.**
- **Rx torace**
- **Ecg**

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico come segue:
 - **88387.003 - ANGIO TC FEMORE E ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE DX (SENZA E CON MDC)**
 - **88387.004 - ANGIO TC FEMORE E ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SX (SENZA E CON MDC)**
 - **88387.005 - ANGIO TC GINOCCHIO E GAMBA DX (SENZA E CON MDC)**
 - **88387.006 - ANGIO TC GINOCCHIO E GAMBA SX (SENZA E CON MDC)**
 - **88387.001 - ANGIO TC CAVIGLIA E PIEDE DX (SENZA E CON MDC)**
 - **88387.002 - ANGIO TC CAVIGLIA E PIEDE SX (SENZA E CON MDC)**

Preparazione

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione .

Il giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 7-8 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l' esame:

- assumere al mattino una compressa di **PREDNISONE 50 mg.**
- assumere a mezzogiorno una compressa di **OMEPRAZOLO 20 mg**
- assumere alla sera una compressa di **CETRIZINA 10 mg.**

Nei pazienti diabetici che assumono la metformina, previa consultazione del diabetologo, sostituire la stessa con altro ipoglicemizzante orale, due giorni prima due giorni dopo l'esame.

N.B.: Per i soggetti Cardiopatici, con obesità patologica o pazienti neoplastici defedati è necessario esibire in visione anche un **Ecocolordoppler Cardiaco** eseguito non oltre i 4 mesi precedenti.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76, 081 536.79.25** o consultate il nostro sito:www.mavissrl.it

Mavis S.r.l.

C.F. e P. Iva 07153721217 – Rea 865157 – Capitale Sociale Euro 50.000,00

Via Dante 13/15 – 80058 Torre Annunziata (NA)

Tel 081.861 12 76 Fax 081. 861 69 34

www.mavissrl.it – info@mavissrl.it